



Cécité, perte de vision, problèmes oculaires après vaccination (Cervarix et Gardasil)- Données du VAERS

Cervarix

VAERS ID	Nombre de jours	Commentaires
362372	non connu	A perdu la vue pendant un mois. Le médecin a estimé que le problème était vraisemblablement lié au Cervarix
368165	1 jour	Sujet britannique – photophobie, hypersensible à la lumière + réactions allergiques au vaccin. Graves maux de tête; la jeune fille a dû être hospitalisée.
368695	le même jour	Sujet britannique – vision trouble, douleurs thoraciques, respiration courte, problèmes de pupille, administration de deux doses d’adrénaline – possible réaction anaphylactique.
369980	le même jour	Sujet britannique – perte de la vue, douleurs thoraciques, température élevée, faiblesse des membres et nausées. Dû être hospitalisée. Souffrait du rhume des foins avant la vaccination.
376317	Premiers effets secondaires après 6 jours. 26 jours plus tard perte presque totale de la vue	Cécité unilatérale, sclérose en plaques, névrite optique, acuité visuelle réduite..
386268	16 jours	Perte de la vue à un œil, douleurs dans la moitié de la tête. Plus tard dans l’autre moitié. La jeune fille a dû être hospitalisée. Souffrait d’allergies et de rhinite allergique avant la vaccination.
388995	1 jour	Nystagmus, vision trouble. Les autorités ont reconnu que ces problèmes étaient probablement à mettre en relation avec la Cervarix.

Gardasil

Jeune fille de 16 ans, perte bilatérale de la vue, hémiparésie gauche après une vaccination contre le papilloma virus humain.

Journal of Child Neurology, Vol. 25, n°3, Mars 2010, p.321-327.

Les symptômes de la jeune fille sont apparus 10 jours après la vaccination (Gardasil)

VAERS ID	Nombre de jours	Commentaires
288453	13 jours	Sclérose en plaques après 6-8 semaines. Cécité au cours de la même période. Dû être hospitalisée pour le diagnostic de sclérose en plaques.
296062	Le même jour	Cécité. Impossibilité de voir quoi que ce soit pendant ses occupations.
326390	Le même jour	Cécité, alopecie.La perte de cheveux est courante avec le Gardasil.
334083	Deux jours	Alopecie. Perte partielle de la vision. Nombreux effets secondaires vécus par les filles après Gardasil. Les effets secondaires dont cette personne a eu à souffrir est horrible ; ils sont trop nombreux pour être cités. La vie de cette personne a été mise en danger.
370783	26 jours	Névrite optique avec perte de la vue.
Blindness Unilateral		
310913	33 jours	Perte de la vision à l'œil gauche. Névrite optique. La personne qui rapporte ce cas a estimé qu'il y avait une relation avec la vaccination. La causalité n'a pas été déterminée à ce moment-là.
321779	4 jours	Perte de vision à l'œil droit. Côté de la figure et bras paralysés. Douleurs aux articulations - suspicion de sclérose en plaques.
324890	1 jour	Perte de la vue à l'œil gauche. Céphalée du côté droit. Perte de sensation qui a commencé près de la bouche. Fourmillements sur la figure et la main gauche.