

***Recommandations pour une cardioversion pharmacologique d'une FA de moins de 7 jours***

Anti-arythmique	Voie d'administration	Niveau de recommandation	Niveau de preuve
Flecainide	Per os ou IV	I	A
Propafénone	Per os ou IV	I	A
Amiodarone	Per os ou IV	II a	A
Quinidine	Per os	II b	B
Digoxine	Per os ou IV	III	A
Sotalol	Per os ou IV	III	A

***Recommandations pour une cardioversion pharmacologique d'une FA de plus de 7 jours***

Anti-arythmique	Voie d'administration	Niveau de recommandation	Niveau de preuve
Amiodarone	Per os ou IV	II a	A
Flecainide	Per os	II b	B
Propafénone	Per os ou IV	II b	B
Quinidine	Per os	II b	B
Sotalol	Per os ou IV	III	A
Digoxine	Per os ou IV	III	C

***Recommandations des doses médicamenteuses utilisées pour une cardioversion de FA***

Anti-arythmique	Voie d'administration	Posologie	Effets indésirables potentiels
Amiodarone	Per os :	30 mg/kg en 1 prise ou 1.2 à 1.8g/j jusqu'à dose cumulée de 10g puis 200 - 400 mg/j	Hypotension Bradycardie Allongement QT
	IV :	5 – 7 mg/kg sur 30-60 min puis 1.2 à 1.8g/j IVSE	Torsade de pointe (rare) Troubles digestifs Veinite (IV)
Flecainide	Per os	200 –300 mg/j	Hypotension, Flutter à conduction rapide
Propafénone	Per os :	450 – 600 mg/j	Hypotension, Flutter à conduction rapide
Quinidine	Per os :	0.75–1.5 g/6–12 heures	Allongement QT Torsade de pointe
	IV :	1.5 – 2.0 mg/kg sur 10 – 20 min	Hypotension Troubles digestifs