



LES REUNIONS ELEVEURS FELINS  
N°05

**Ecole Vétérinaire d'Alfort**

**En direct de l'UMES**



## **Facteurs modifiant l'aspect du pelage félin (hors alimentation)**

La dernière réunion UMES – éleveurs félins a débuté par un exposé présenté par le Dr Grellet, exposé ayant pour thème « Sensibilité et affections dermatologiques dans l'espèce féline en milieu d'élevage »; de petits groupes de travail ont ensuite été formés, dont la réflexion a tourné autour de la préparation du pelage avant les expositions, ainsi que sur les précautions à prendre concernant le pelage au retour d'exposition. Ce compte-rendu expose dans un premier temps la présentation du Dr Grellet, puis dans un deuxième temps les idées exposées par les différents acteurs présents lors de cette réunion (éleveurs et vétérinaires).

Le sujet est abordé sous l'angle de 4 grands syndromes en dermatologie: le prurit, les alopecies, les croûtes et les ulcérations.

### **Le prurit**

Le prurit est une démangeaison qui incite l'animal à se gratter. Le chat se gratte peu, en revanche il a plus tendance à se lécher si une partie du corps le démange (toutefois ce n'est pas toujours facile à observer).

*Exemple de 2 affections prurigineuses:*

#### **Les puces**

L'infestation par des puces se nomme une pulicose. L'infestation entraîne un prurit modéré, et parfois un squamosis (présence de pellicules) lorsque l'infestation est sévère. Le prurit peut être beaucoup plus sévère lorsque le chat infesté est allergique à la salive des puces (Dermatite par Allergie aux Piqûres de Puces), affection très fréquente, parfois spectaculaire (la présence d'une seule et unique puce peut entraîner un prurit intense ayant pour conséquence des lésions dermatologiques sévères!).

#### **L'allergie alimentaire**

Chez certains chats, l'ingestion de certains aliments entraîne des manifestations cliniques dont la plus fréquente est le prurit.

En effet, certaines molécules de très grosses tailles peuvent entraîner une réaction allergique

chez l'animal, mais cette réaction ne devient visible que 6 mois à 2 ans après la première ingestion allergisante.

### **Les alopecies**

Une alopecie est une chute de poils partielle ou totale, qui peut être la conséquence du prurit (le chat, en se grattant ou en se léchant, provoque la chute des poils).

*Exemple de 2 affections alopeciques:*

#### **Alopecie auto-induite comportementale**

L'alopecie comportementale est liée à un état d'anxiété du chat. La lésion d'alopecie peut être symétrique ou localisée à une région précise.

Pour traiter le chat, il faut identifier la source d'anxiété du chat: déménagement, introduction d'un nouvel individu, naissance d'un enfant... et contrôler l'intensité du stress (ou ôter la source de stress si cela est possible).

#### **Dermatophytose (ou teigne)**

La teigne est une mycose (maladie due à un champignon) très contagieuse, ayant un potentiel zoonotique (transmissible du chat à l'homme). Les lésions sont extrêmement variables, mais la lésion « classique » est une alopecie nummulaire, en forme de pièce de monnaie.



Lésion nummulaire alopecique et squameuse, classique de la teigne chez le chat.

La stratégie thérapeutique allie un traitement de l'environnement et un traitement des animaux (local et par voie orale).



### Les croûtes

Une croûte est la coagulation d'un exsudat à la surface de la peau mélangé à du sang, du sérum, ou du pus. Les croûtes peuvent également être la conséquence du prurit.

*Exemple de 2 affections croûteuses:*

#### La cheyletiellose

La cheyletiellose est une affection due à l'infestation par des Acariens; ces derniers peuvent infester les chats, mais également les humains (c'est une zoonose). Chez le chat, cette affection se traduit par un squamosis (présence de pellicules) qui peut être croûteux, surtout sur la tête et le tronc. Chez l'homme, l'infestation se traduit par l'éruption de boutons et d'une forte démangeaison cutanée.

#### La gale otodectique

La gale otodectique est une affection due à l'infestation par d'autres Acariens, cette fois-ci ne se transmettant pas à l'Homme. Cette affection, extrêmement fréquente, se traduit par la présence d'une otite bilatérale, avec des conduits auditifs érythémateux et la présence de cérumen noirâtre nauséabond. Des croûtes peuvent alors se former. Généralement, cette affection reste localisée aux conduits auditifs.

### Les ulcérations

Une ulcération est une destruction plus ou moins superficielle de la peau ou de la muqueuse et comportant une perte de substance. Du fait de la finesse de la peau du chat, les ulcères sont assez fréquents.

*Exemple d'une affection ulcérate : le Complexe Granulome Eosinophilique*

Le complexe granulome éosinophilique (CGE) est une lésion d'inflammation (certaines cellules immunitaires étant recrutées localement de manière incontrôlée) dont la cause n'est pas, à ce jour, clairement identifiée: on incrimine une composante allergique (DAPP, allergie alimentaire), mais des causes parasitaires (cheyletiellose) sont également suspectées, de même que des causes virales ou encore une prédisposition génétique.

Le CGE peut prendre plusieurs formes cliniques:

- l'ulcère atone (souvent sur la lèvre supérieure ou sur le palais)
- la plaque éosinophilique (plaque rouge, généralement sur l'abdomen, la région inguinale ou les cuisses)
- le granulome linéaire (inflammation linéaire sur la face postérieure des cuisses, flancs).

### Comment préparer le pelage de mon chat pour une exposition?

La préparation du pelage varie en fonction de la nature du poil. Chez le Persan, de nombreux éleveurs font un shampoing la veille de l'exposition, tandis que pour les chats à poils mi-longs, le shampoing a lieu 3 à 4 jours avant :

- un premier lavage a pour rôle de dégraisser le pelage (utilisation de Paic Citron ND par exemple);
- un deuxième lavage éventuel sert à faire tomber les poils morts;
- un troisième lavage est réalisé à l'aide d'un shampoing lavant pour pelage félin;
- ensuite vient l'après-shampoing;
- le rinçage dure de 10 à 15 minutes;
- puis un conditionnement sert à séparer les poils.

Il est très important de toiletter également la tête (c'est l'occasion de vérifier les oreilles et de les nettoyer) et les pattes.



Ne pas oublier de vérifier les oreilles !

### Comment gérer le retour d'exposition?

Le retour d'exposition doit faire l'objet d'une attention particulière afin de ne pas ramener d'agent pathogène au sein de son effectif. En particulier, un soin est porté au matériel d'exposition (nettoyage et désinfection, changement des vêtements). Certains lavent de nouveau leur chat exposé, ou passent juste une lingette imprégnée de désinfectant sur le chat.