

Bulletin Phaethon, 1995, 2 : 106.

Note sur un Noddi à bec grêle apporté par le Cyclone Ingrid le 27 février 1995

Yves Amauri* & Jean-Michel Probst**

*56 lot Evêché 2, 97470 Saint Benoît

** Nature & Patrimoine

BP 279, 97 827 Le Port Cedex

Les cyclones apportent souvent avec eux des oiseaux de mer d'autres régions ou des oiseaux migrateurs qui restent généralement loin des côtes (Barré & Barau, 1982). Dans la famille des Sternidae, hormis le Noddi brun qui niche à La Réunion, un article sur les oiseaux migrateurs observés à La Réunion, signale la présence de 5 espèces de sternes migratrices : le Noddi à bec grêle, la Sterne fuligineuse, la Sterne de Dougall, la Sterne bridée et la Guifette leucoptère (Barré, 1983). Il est intéressant de constater que la plupart de ces espèces déjà décrites et d'autres nouvelles depuis 1983 ont souvent été apportées par des temps cycloniques ou des dépressions tropicales plus ou moins intenses. Certaines espèces de sternes migratrices qui s'observent le plus souvent au large des côtes sont ainsi chassées par les vents puissants en direction des rivages.

En 1965, une Sterne de Dougall avait été apportée par une dépression cyclonique. En 1989, le cyclone Firinga avait contraint une jeune sterne fuligineuse à se poser sur le Barachois (Comm. pers. Dominique Strasberg et Christophe Thébaud). En novembre 1991 et en février 1994, des vents violents ont permis d'observer la Sterne bridée en Baie de Saint-Paul puis au large du Port (Probst, 1995). En ce mois de février, apporté par le Cyclone Ingrid, un Noddi à bec grêle est retrouvé blessé sur le littoral Est de l'île de La Réunion.

Au petit matin du lundi 27 février, l'un de nous (Y.A.), trouve un oiseau de mer sur le littoral de Saint-Benoît. L'oiseau reste prostré le long du muret attenant à la piscine municipale de la Gare. Il se laisse aisément capturer et présente une aile pendante qui laisse présager une fracture. L'oiseau est montré à l'entourage, mais personne n'a observé cette espèce auparavant. La détermination de cette espèce ne laisse aucun doute. Il s'agit d'un Noddi à bec grêle *Anous tenuirostris*. Le manteau brun noir, le front et une partie du dessus de la tête blanche, le bec droit, fin et noir, le liseré blanc pur autour de l'œil sont les critères

principaux qui permettent de distinguer cette espèce du Noddi brun *Anous stolidus* qui niche à La Réunion (Petite Ile).

Les colonies de nidification les plus proches de notre île sont celles établies à Maurice sur l'île aux Serpents et à Rodrigues sur les îlots Coco et Sable. Dans ces îlots, elle est très commune et très connue des pêcheurs qui l'appellent « Marianne ». À La Réunion, elle passe souvent inaperçue au milieu des groupes de Noddi brun et serait appelée « Petit Macoua » (Comm. pers. Joël Dupont). Notons pour conclure que cet individu est malheureusement mort des suites de ses blessures et a été naturalisé par Jean-Pierre Palencia, le taxidermiste du Muséum de Saint Denis de La Réunion.

Bibliographie

BARRE, N. et BARAU, A. 1982. Oiseaux de la Réunion. Imprimerie Arts graphiques modernes, St Denis, La Réunion, 1-196.

BARRE, N. 1983. Oiseaux migrateurs observés à La Réunion. L'Oiseau & RFO, Vol. 53 : 4 : 323-333.

PAYET, M. ; LOUISIN, J-M. & PROBST, J-M. 1995. Les oiseaux marins erratiques et migrateurs rares répertoriés à La Réunion. Bull. Phaethon, 1 : 9-13.