

## VACCINATION COMMENT AMÉLIORER L'INFORMATION AUX PARENTS AVANT ET APRÈS ?

DR M-CH. MAUROY  
MÉDECIN COORDONNATEUR

~~Des étiquettes sont disponibles pour rappeler aux parents les conseils de surveillance de l'enfant à l'issue d'une vaccination~~

A la demande du Conseil médical, l'ONE a créé des étiquettes explicatives qui peuvent être collées dans le carnet de l'enfant après une vaccination, afin d'éviter de devoir recopier les recommandations données aux parents. Ceci est particulièrement important lorsque la vaccination a été réalisée en milieu d'accueil, en dehors de la présence d'un parent.

Vous pouvez vous procurer des étiquettes sur simple demande auprès du secrétariat de la Coordination médicale :

M<sup>lle</sup> M. PLASSART ou M<sup>me</sup> G. HINNE  
Secrétariat du Médecin Coordonnateur  
Tél. : 02/542 15 63 – 02/542 15 44  
Mail : [marjolaine.plassart@one.be](mailto:marjolaine.plassart@one.be) – [genevieve.hinne@one.be](mailto:genevieve.hinne@one.be)

Ou auprès du secrétariat médical de votre subrégion. Un exemplaire de chaque vous est transmis en annexes. Une petite réserve sera également mise à votre disposition dans le local d'équipe. Il vous est aussi possible d'imprimer vous-même ces étiquettes selon la procédure suivante:

Intranet ONE → « Documents ONE » → « Documents médico-sociaux » → « vaccinations » → « dans documents d'information » → « vaccination en milieu d'accueil » → « étiquettes pour avis aux parents ».

### CONCERNE VACCIN ROUGEOLE-RUBÉOLE-OREILLONS

Chers Parents,

Votre enfant a été vacciné ce jour. Ne vous inquiétez pas s'il présente dans les 15 jours qui suivent : une réaction locale discrète (rougeur, gonflement), une éruption cutanée, un gonflement des ganglions du cou ou de la fièvre (il est conseillé de donner du paracétamol pour la faire diminuer à partir de 38,5°C).

Si vous constatez l'apparition d'autres symptômes ou si la fièvre ne descend pas, nous vous recommandons de contacter votre médecin sans tarder.

### CONCERNE VACCINS INFANRIX HEXA, PRÉVENAR ET MÉNINGOCOQUE

Chers Parents,

Votre enfant a été vacciné ce jour. Il peut présenter dans les 48h une réaction locale discrète (rougeur, gonflement) ou de la fièvre (il est conseillé de donner du paracétamol pour la faire diminuer à partir de 38,5°C).

Si vous constatez l'apparition d'autres symptômes ou si la fièvre ne descend pas, nous vous recommandons de contacter votre médecin sans tarder.