



COMMISSION NATIONALE DES JUGES DE FRANCE

SECTION EXOTIQUES
PSITTACIDES



STANDARD DES CACATOES BLANCS ET DU CACATOES ROSALBIN

CLASSE : AVES
ORDRE : PSITTACIFORMES
FAMILLE : CACATUIDAE
SOUS FAMILLE : CACATUINAE
CALYPTORHYNCHINAE
GENRE : CALYPTORHYNCHUS
CACATUA
EOLOPHUS
LOPHOCREA

OPUSCULE GRATUIT A USAGE PEDAGOGIQUE

Toute reproduction totale ou partielle est interdite sans autorisation écrite préalable du président de la
Commission Nationale des Juges de France.

Cette dernière se réserve le droit de modifier ce standard en fonction de l'évolution des élevages.

La Section Psittacidés de la Commission Nationale des Juges de France apporte un soin tout particulier à la rédaction et à la publication des standards dont elle a la charge. Tous les points traités sont concentrés sur un seul objectif : donner aux clubs et aux éleveurs une information précise et rigoureuse concourant à la qualité des oiseaux.

La Section Psittacidés espère avoir répondu à vos attentes de façon satisfaisante. Elle formule aussi l'espoir qu'il sera réservé un bon usage de ce standard. En vous remerciant pour votre confiance.

La Section Psittacidés

Cet opuscule est gratuit et disponible par téléchargement uniquement sur le site de l'Union Ornithologique de France : www.ornithologies.fr.

Nos recommandations pour protéger la nature :

1. Imprimer cet opuscule uniquement si besoin est de travailler sur un support papier.
2. Imprimer en recto verso pour diminuer la consommation de papier.
3. Imprimer sur papier FSC .

TABLE DES MATIERES

Préambule.....	4
Informations générales.....	5
Taxonomie.....	5
Distribution géographique.....	5
Protection des Espèces.....	5
Statut en captivité.....	5
Silhouette des Cacatoès.....	6
Présentation en concours.....	7
<i>Cacatua goffiniana</i>	8
<i>Cacatua haematuropygia</i>	9
<i>Cacatua ducorpsii</i>	10
<i>Cacatua sanguinea</i>	11
<i>Cacatua tenuirostris</i>	12
<i>Cacatua pastinator</i>	13
<i>Cacatua sulphurea</i>	14
<i>Cacatua sulphurea citrinocristata</i>	15
<i>Cacatua galerita</i>	16
<i>Cacatua galerita eleonara</i>	17
<i>Cacatua galerita triton</i>	18
<i>Cacatua alba</i>	19
<i>Cacatua moluccensis</i>	20
<i>Cacatua ophthalmica</i>	21
<i>Lophocrea leadbeateri</i>	22
<i>Eolophus roseicapilla</i>	23

NDLR : Aucune mutation décrite dans ce standard

Dans ce standard, chaque espèce est appelée par le nom scientifique donné par *International Ornithologist's Union*. Cette organisation se réunit régulièrement et affine les noms des taxons. En conséquence, il peut y avoir des différences avec les appellations CITES (que nous avons pris le soin de rappeler).

En supplément, les noms vernaculaires les plus courants sont aussi indiqués en cinq langues : français, anglais, allemand, espagnol et italien.

Crédit Photo

Page de couverture

- Cacatoès de Goffin (Photo Sylvain Chartier)

Vignette de chaque standard

- Cacatoès à huppe orange - Cacatoès aux Yeux bleus - Cacatoès nasique - Cacatoès Rosalbin - Cacatoès Leadbeater
Cacatoès de Ducorps (Photo Olivier Bauchet)
- Autres : Source Wikipedia

Retouche d'images : CNJF Section Psittacidés.

Préambule

Dès lors qu'une espèce animale est élevée en captivité de façon régulière, que les connaissances acquises et le savoir faire des éleveurs ont maîtrisé leurs reproductions depuis plusieurs générations, ladite espèce est en voie de domestication. Bien souvent chez les oiseaux, cette domestication se confirme par l'apparition de couleurs nouvelles que l'aviculture sait aujourd'hui parfaitement fixer et maintenir.

Si l'objectif premier d'un éleveur est bien de réussir la reproduction de ses oiseaux, que ce soit dans leur couleur originelle (le phénotype sauvage) ou celle de couleurs nouvelles (bien souvent des mutations), il existe un second objectif dont il ne faut pas négliger pour autant la portée : la qualité des sujets détenus en captivité.

Au stade actuel de l'élevage des Cacatoès blancs en Europe, en 2012, le présent standard s'est attaché principalement à lister toutes les espèces existantes, en quantité plus ou moins nombreuse en captivité. Le standard respecte les caractéristiques particulières de chaque espèce et ses éventuelles sous-espèces ; les décrit dans leur phénotype sauvage et marque leurs différences. Ce standard se veut aussi de garder la diversité des sous-espèces ; ce qui pourrait disparaître à plus ou moins long terme sous l'effet de la domestication et/ou la vulgarisation de l'élevage des espèces.

Une absence de rigueur dans la sélection des oiseaux, notamment lorsqu'il s'agit de sous-espèces différentes ou de sujets mutés, conduit inévitablement à la non qualité. Et celle-ci pourrait à terme provoquer des dégâts importants sur les souches captives d'une espèce : oiseaux intermédiaires, chétivité, tares héréditaires, manque de vitalité...

C'est pourquoi sont nées des manifestations ornithologiques comme les concours d'oiseaux de cages et de volières, dits aussi oiseaux de compagnie. Ces événementiels ont comme mérite de réunir plusieurs centaines ou milliers d'oiseaux classés selon leurs espèces et leurs couleurs. Un juge, qui a suivi une formation spécifique avant de pouvoir exercer, apprécie les sujets en compétition selon des critères précis définis dans un standard.

Le standard est le fruit d'une longue étude de la part de la Commission Nationale des Juges de France et a comme but de décrire l'image virtuelle et idéale de la qualité d'une espèce d'oiseau dans toutes les couleurs connues, pour autant que ces dernières soient bien consolidées en captivité et aient atteint un niveau qualitatif suffisant depuis plusieurs générations.

La publication d'un standard poursuit donc plusieurs buts : réfléchir sur un sujet idéal, faire évoluer cet idéal au fil de la progression des élevages, maintenir la qualité des souches captives, orienter les éleveurs dans la sélection de leurs sujets reproducteurs.

En France, la seule organisation reconnue pour publier des standards officiels est la Commission Nationale des Juges de France (C.N.J.F.), seul membre reconnu pour son pays par l'Organisation Mondiale des Juges (O.M.J.).

La Commission Nationale des Juges de France.
Section Psittacidés

Informations générales

Taxonomie

Le présent standard reprend la classification des taxons donnée par l'International Ornithologist's Union qui donne 374 espèces pour les Psittaciformes et 21 espèces pour les Cacatuidae.

Classe :	Aves	NDLR
Ordre :	Psittaciformes	Famille Cacatuidae (21 espèces)
Famille :	Cacatuidae	○ genre Probosciger (1 espèce)
Sous-famille :	Cacatuinae	○ genre Calyptorhynchus (5 espèces)
Genre :	<i>Cacatua</i>	○ genre Callocephalon (1 espèce)
<i>Des Cacatoès</i>	<i>Eolophus</i>	○ genre Lophochroa (1 espèce)
<i>blancs</i>	<i>Lophocroa leadbeateri</i>	○ genre Eolophus (1 espèce)
		○ genre Cacatua (11 espèces)
		○ genre Nymphicus (1 espèce)

Les [Cacatuidae](#) forment une famille de perroquets dont la taille est comprise entre 30 et 68 centimètres selon les taxons. Ils portent tous un nom vernaculaire commençant par Cacatoès à l'exception de la Perruche Calopsitte (*Nymphicus hollandicus*), la plus petite espèce. Les Cacatoès se caractérisent par un bec important, une langue musclée, une queue courte et carrée, une vésicule biliaire, une huppe érectile sur le devant de la tête (de forme différente selon les taxons) pour exprimer leurs émotions.

Chez les Cacatoès, la couleur générale verte, caractéristique principale de l'ordre des Psittaciformes, n'existe pas. Ceci pour deux raisons : absence de mélanines chez les Cacatoès blancs ; ou encore présence de mélanines chez les Cacatoès noirs mais couleur structurale absente.

Distribution géographique

Les Cacatoès vivent tous originaires du Continent Australien et d'îles au Nord de ce continent : Papouasie, Nouvelle-Guinée, certaines des îles d'Indonésie jusqu'aux Philippines au Nord.

Ce sont des espèces grégaires qui vivent dans des milieux variés, allant de la forêt humide aux zones de broussailles sèches.

Distribution des Cacatoès
Noirs et Blancs. Source Wikipedia.



Protection des Espèces

Toutes les espèces de Cacatoès sont sous un statut de protection selon l'IUCN. Certains taxons sont très nombreux en Australie comme le Cacatoès Rosalbin (*Eolophus roseicapilla*) tandis que d'autres figurent sur liste rouge de l'I.U.C.N et sont au bord de l'extinction : (*Cacatua haematuropygia*) à cause des activités humaines : déforestation, commerce légal et illégal... Toutes les espèces sont donc rangées à l'Annexe 1(A) ou 2(B) de la Convention de Washington. Aucune n'est considérée comme domestique selon la législation française. (Arrêté du 11/08/06). Statut de chaque espèce reportée dans leurs standards.

In situ selon



EX : Totalemment éteint
EW : Eteint dans la nature
CR : Critique
EN : En danger
V : Vulnérable
NT : Quasi menacé
LC : Préoccupation mineure

Statut en captivité

Les Cacatoès sont des perroquets de plus en plus présents en captivité grâce aux éleveurs qui réussissent à les faire reproduire soit par les parents (E.P.P.), soit par l'élevage à la main (E.A.M.). Ceci étant, ce ne sont pas des espèces faciles à élever et réservées aux débutants. Il faut de la place en extérieur, de la patience vu leur âge de reproduction et la difficulté de former des couples, de la surveillance à l'encontre des plus agressifs. Il leur faut aussi des installations solides vu la puissance de leur bec.


Ce sont de charmants oiseaux de compagnie lorsqu'ils sont élevés à la main mais attention à leurs très fortes imprégnations qui peut se révéler désastreuses pour leur psychisme en cas d'abandon.

Silhouette des Cacatoès

Il existe trois profils types de huppe chez les Cacatoès.

Profil de Huppe 1	Profil de Huppe 2	Profil de Huppe 3
		
<p>NDLR : Groupe d'espèces dites « Corella » en nom vernaculaire anglais caractérisé par :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un bec moins puissant et de couleur corne - forme de la huppe - Psittacines roses 	<p>NDLR : Groupe d'espèces dites « Cockatoo » en nom vernaculaire anglais caractérisé par :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un bec noir puissant - Une huppe à plumes longues et jaunes tournées vers l'avant 	<p>NDLR : Groupe de trois espèces caractérisé par :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un bec très puissant noir, - Une huppe à plumes longues tournées vers l'arrière

Profil du Cacatoès



Cacatua molucensis

Présentation en concours

Le standard est rédigé pour des oiseaux ayant atteint l'âge adulte. A cet âge, l'oiseau a abandonné totalement les traces des sujets juvéniles et a revêtu son plumage adulte. Egalement, ses qualités physiques : taille, type, dessin et couleur s'expriment pleinement.

Les Cacatoès blancs sont acceptés pendant sept saisons en concours. Cependant, il est préférable d'attendre qu'ils soient dans leurs deuxième ou troisième années (selon les espèces) pour les présenter en concours, faute de quoi ils seront pénalisés.

Les oiseaux présentés en concours doivent être bagués. Diamètre recommandé : (Voir le standard de chaque taxon). Une seule bague, anodisée ou de couleur, est acceptée. Si un oiseau possède deux bagues ou plus, le juge a comme obligation de le signaler aux organisateurs du concours.

Le modèle de volière de concours pour les Cacatoès Blancs est :

Réf. COM	Réf UOFCOM France	Dimensions En cms	Type	Façade	Nb barreaux Façade	Perchoirs		
						Nb	Diamètre	Ecart
XV	V	200 x 100 x 50		Noire	Sans Objet	1	30 - 60 mm Bois dur	SO

La volière est peinte en noir. Son état physique doit être parfait sans élément saillant de nature à blesser l'oiseau. La volière doit être propre et ne pas disposer d'aucun signe de reconnaissance. Seule est acceptée une étiquette apposée sur le panneau frontal reprenant l'identification minimale du sujet exposé : (*Modèle non contractuel*)

N° Cage	Classe	Année	N° Bague
1237	K 17- 30	2011	047
Dénomination Cacatoès Rosalbin			

NDLR

Au niveau de la COM, seul le nom latin est reconnu

Eolophus roseicapilla

Pour le concours, il est important de préparer ces oiseaux auparavant. A cet effet, l'éleveur habituera progressivement ces sujets à la volière avant le concours afin que ceux-ci ne soient pas désorientés et stressés devant le juge. Un oiseau adulte est plus calme et plus facile qu'un jeune à préparer. Les Cacatoès qui ne sont pas habitués aux volières de concours se perchent moins bien, s'accrochent au grillage du panneau arrière et les juges rencontrent des difficultés pour les apprécier dans ce cas.

Il est recommandé de déposer un lit de copeaux sur le sol des volières afin que l'oiseau ne se souille pas par ses fientes (très visibles sur les plumages très blancs). Il faut aussi éviter de donner la nourriture et l'eau dans des godets suspendus sur la grille à l'intérieur. L'option des godets à bascule en façade est recommandée.

Comme nourriture, la CNJF préconise le mélange de graines suivant :

Cardy : 17%	Tournesol blanc : 16%	Tournesol strié : 14%	Dari : 13%	Milo : 6%	Chanvre : 4%
Sarrasin : 4%	Avoine pelée : 4%	Avoine pointée : 3%	Froment : 3%	Maïs plata : 3%	Riz paddy : 3%
Pois : 2%	Graines de lin : 2%	Millet jaune : 2%	Vescins ; 1%	Katjang idjoe : 1%	
Pépins de courge : 1%					

Pour les éleveurs élevant, leurs oiseaux avec des pellets (granulés), il faudra donner la marque aux organisateurs du concours ou encore mieux, leur remettre un sac de ces granulés.

Ce mélange sera additionné au quotidien d'un quartier de pomme golden ou de carotte dont l'origine est connue et débarrassée des pesticides. Les restes de fruits et légumes non consommés de fruits ou légumes seront éliminés le jour d'après. L'eau sera renouvelée tous les jours avec un nettoyage complet de l'abreuvoir.

Cacatua goffiniana

Anciennement *Cacatua goffini*




Nom français : Cacatoès de Goffin
 Nom anglais : Goffin's Corella, Tanimbar Corella
 Nom allemand : Goffinkakadu
 Nom espagnol : Cacatua de las Tanimbar
 Nom italien : Cacatua di goffin

Origine : Archipel Tanimbar en Indonésie

Pas de Sous-espèce / No subspecies.
 Bague / Ring Ø : 10 mm.

STANDARD	ANNOTATIONS
<p>STANDARD DE LA FORME ET DE LA POSTURE</p> <p>Taille : 30 – 32 cm.</p> <p>Type</p> <p><i>Tête</i> : Tête petite et ronde. <i>Huppe</i> : Petite et droite (2-3 cm). <i>Corps</i> : Oiseau fin et harmonieux. <i>Ailes</i> : Serrées le long du corps. Le bout des rémiges se rejoignent sur la queue sans se croiser. <i>Dos</i> : Bien rectiligne, sans creux ni bosse. Maintien : 70°. Pattes : Les doigts enserrant bien le perchoir. Ongles intacts. Bec : Rond et fin. Condition : Plumage lisse et bien net.</p> <p>STANDARD DE COULEUR ET DESSIN</p> <p>Huppe : Blanche. Joues : Lores et sous-plumes rosées du masque. Corps : Blanc. Ailes : Blanches sur les parties supérieures ; jaune & blanc sur l'intérieur. Queue : Blanches sur les parties supérieures ; jaune & blanc sur le dessous. Bec : Gris corne. Œil : Iris brun foncé - Cercle oculaire blanc. Pattes : Gris. Ongles : Noir.</p> <p>REMARQUES</p> <p>On remarque des différences de taille et de couleur.</p>	

In situ selon



Internationale 1 2 3
 1992



Européenne A B C D

Cacatua haematuropygia

Nom français : Cacatoès des Philippines
 Nom anglais : Red-vented Corella, Philippine Cockatoo
 Nom allemand : Rotsteiβkakadu
 Nom espagnol : Cacatua Filipina
 Nom italien : Cacatua dal sottocoda rosso

Pas de Sous-espèce / No subspecies.
 Bague / Ring ø : 10 mm.

Origine : Philippines




STANDARD	ANNOTATIONS
<p>STANDARD DE LA FORME ET DE LA POSTURE Taille : 30 – 31 cm Type</p> <p><i>Tête</i> : Tête petite et ronde. <i>Huppe</i> : Petite et droite (2-3 cm). <i>Corps</i> : Oiseau fin et harmonieux. <i>Ailes</i> : Serrées le long du corps. Le bout des rémiges se rejoignent sur la queue sans se croiser. <i>Dos</i> : Bien rectiligne, sans creux ni bosse. Maintien : 70°. Pattes : Les doigts ensèrent bien le perchoir. Ongles intacts. Bec : Rond et fin. Condition : Plumage lisse et bien net.</p> <p>STANDARD DE COULEUR ET DESSIN <i>Huppe</i> : Blanche. <i>Oreillons</i> : Jaune orangé très clair. <i>Corps</i> : Blanc avec suffusions jaunes. <i>Ailes</i> : Blanches sur les parties supérieures ; jaune & blanc sur l'intérieur. <i>Queue</i> : Blanches sur les parties supérieures ; jaune & blanc sur le dessous. Les sous-caudales sont rouges avec les extrémités blanches. Bec : Gris corne Œil : Iris brun foncé (<i>Mâle</i>) – Iris brun rouge (<i>Femelle</i>) - Cercle oculaire blanc. Pattes : Gris Ongles : Noirs</p> <p>REMARQUES Néant.</p>	

In situ selon

Critical



Internationale



1992



Européenne



Cacatua ducorpsii

Nom français : Cacatoès de Ducorps
 Nom anglais : Ducorp's Corella, Solomons Corella
 Nom allemand : Salomonenkakadu
 Nom espagnol : Cacatua de las Salomon
 Nom italien : Cacatua di Ducorps



Pas de Sous-espèce / No subspecies
 Bague/Ring ø : 10 mm.

Origine : Iles Solomon, Papouasie de Nlle Guinée

STANDARD	ANNOTATIONS
<p>STANDARD DE LA FORME ET DE LA POSTURE</p> <p>Taille : 30 – 32 cm.</p> <p>Type</p> <p><i>Tête</i> : Tête fine</p> <p><i>Huppe</i> : Droite et bien fournie (5-7 cm)</p> <p><i>Corps</i> : Oiseau fin et harmonieux.</p> <p><i>Ailes</i> : Serrées le long du corps. Le bout des rémiges se rejoignent sur la queue sans se croiser.</p> <p><i>Dos</i> : Bien rectiligne, sans creux ni bosse.</p> <p>Maintien : 70°.</p> <p>Pattes : Les doigts ensèrent bien le perchoir. Ongles intacts.</p> <p>Bec : Rond et fin, assez saillant.</p> <p>Condition : Plumage lisse et bien net.</p> <p>STANDARD DE COULEUR ET DESSIN</p> <p>Huppe : Blanche.</p> <p>Joues : Blanches.</p> <p>Tête : Légères suffusions roses sur l'ensemble de la tête.</p> <p>Corps : Blanc.</p> <p>Ailes : Blanches sur les parties supérieures ; jaune & blanc sur l'intérieur.</p> <p>Queue : Blanches sur les parties supérieures ; jaune & blanc sur le dessous.</p> <p>Bec : Gris corne.</p> <p>Œil : Iris brun foncé - Cercle oculaire bleu.</p> <p>Pattes : Gris.</p> <p>Ongles : Noir.</p> <p>REMARQUES Néant.</p>	

In situ selon



Least concern



Internationale



1992



Européenne



Cacatua sanguinea

Nom français : Cacatoès à oeil nu
 Nom anglais : Little Corella, Bare-eyed Cockatoo
 Nom allemand : Nacktaugenkakadu
 Nom espagnol : Cacatua Sanguinea
 Nom italien : Picola Corella

Nombre de Sous-espèce / Number subspecies : 5.
 Bague / Ring ø : 10 mm.

Origine : Australie

STANDARD	ANNOTATIONS										
<p>STANDARD DE LA FORME ET DE LA POSTURE</p> <p>Taille : 38 – 40 cm.</p> <p>Type</p> <p><i>Tête</i> : Tête petite et ronde <i>Huppe</i> : Petite et droite (3 cm) <i>Corps</i> : Oiseau allongé haut sur pattes. <i>Ailes</i> : Serrées le long du corps. Le bout des rémiges se rejoignent sur la queue sans se croiser. <i>Dos</i> : Bien rectiligne, sans creux ni bosse. Maintien : 70°. Pattes : Les doigts ensèrent bien le perchoir. Ongles intacts. Bec : Rond et fin. Condition : Plumage lisse et bien net.</p> <p>STANDARD DE COULEUR ET DESSIN</p> <p><i>Huppe</i> : Blanche. <i>Lores</i> : Rosés. <i>Masque</i> : Sous plumes rosées. <i>Corps</i> : Blanc. <i>Ailes</i> : Blanches sur les parties supérieures ; jaune & blanc sur l'intérieur. <i>Queue</i> : Blanches sur les parties supérieures ; jaune & blanc sur le dessous. <i>Bec</i> : Gris corne. <i>Œil</i> : Iris brun foncé - Cercle oculaire bleuté et très étendu sous l'œil. <i>Pattes</i> : Gris. <i>Ongles</i> : Noir.</p> <p>REMARQUES On remarque des différences de taille et de couleur dues aux différentes sous-espèces.</p> <table border="1" data-bbox="106 1592 1203 1794"> <tr> <td><i>C. s. sanguinea</i></td> <td>Taille 40 cm</td> </tr> <tr> <td><i>C. s. normantani</i></td> <td>Plus petit que <i>sanguinea</i></td> </tr> <tr> <td><i>C. s. transfreta</i></td> <td>Dessous des ailes et de la queue de couleur jaune brunâtre</td> </tr> <tr> <td><i>C. s. gymnopsis</i></td> <td>Couleur orange rosé plus foncé sur les lores et plus présente sur la tête et sur la poitrine.</td> </tr> <tr> <td><i>C. s. westralensis</i></td> <td>Couleur orangé rouge sur les lores et à la base des plumes de la tête et des parties inférieures du corps. Jaune plus claire du dessous des ailes et de la queue.</td> </tr> </table>	<i>C. s. sanguinea</i>	Taille 40 cm	<i>C. s. normantani</i>	Plus petit que <i>sanguinea</i>	<i>C. s. transfreta</i>	Dessous des ailes et de la queue de couleur jaune brunâtre	<i>C. s. gymnopsis</i>	Couleur orange rosé plus foncé sur les lores et plus présente sur la tête et sur la poitrine.	<i>C. s. westralensis</i>	Couleur orangé rouge sur les lores et à la base des plumes de la tête et des parties inférieures du corps. Jaune plus claire du dessous des ailes et de la queue.	
<i>C. s. sanguinea</i>	Taille 40 cm										
<i>C. s. normantani</i>	Plus petit que <i>sanguinea</i>										
<i>C. s. transfreta</i>	Dessous des ailes et de la queue de couleur jaune brunâtre										
<i>C. s. gymnopsis</i>	Couleur orange rosé plus foncé sur les lores et plus présente sur la tête et sur la poitrine.										
<i>C. s. westralensis</i>	Couleur orangé rouge sur les lores et à la base des plumes de la tête et des parties inférieures du corps. Jaune plus claire du dessous des ailes et de la queue.										

In situ selon



Least concern



Internationale

1

2

3



Européenne

A

B

C

D

Cacatua tenuirostris

Nom français : Cacatoès nasique
 Nom anglais : Slender-billed Corella, Long-billed Corella
 Nom allemand : Nasenkakadu
 Nom espagnol : Cacatua Pinofina
 Nom italien : Corella beccolungo

Pas de Sous-espèce / No subspecies
 Bague / Ring ø : 12 mm.

Origine : Australie

STANDARD	ANNOTATIONS
<p>STANDARD DE LA FORME ET DE LA POSTURE</p> <p>Taille : 37 - 41 cm.</p> <p>Type</p> <p><i>Tête</i> : Tête petite et ronde. <i>Huppe</i> : Petite et droite (3 cm). <i>Corps</i> : Oiseau large d'épaules. <i>Ailes</i> : Serrées le long du corps. Le bout des rémiges se rejoignent sur la queue sans se croiser. <i>Dos</i> : Bien rectiligne, sans creux ni bosse.</p> <p>Maintien : 80°. Pattes : Les doigts enserrant bien le perchoir. Ongles intacts. Bec : Fin et très allongé (3 – 5 cm). Condition : Plumage lisse et bien net.</p> <p>STANDARD DE COULEUR ET DESSIN</p> <p>Huppe : Blanche. Joues : Blanches. Lores : Rouges avec extension autour de l'œil. Corps : Collérette rouge entre la tête et le corps, Reste du corps blanc avec présence de sous-plumes roses. Ailes : Blanches sur les parties supérieures ; jaune & blanc sur l'intérieur. Queue : Blanches sur les parties supérieures ; jaune & blanc sur le dessous. Bec : Gris corne. Œil : Iris brun foncé - Cercle oculaire bleuté et très étendu sous l'œil. Pattes : Gris. Ongles : Noir.</p> <p>REMARQUES Néant.</p>	

In situ selon



Least concern



Internationale

1

2

3



Européenne

A

B

C

D

Cacatua pastinator

Nom français : Cacatoès laboureur
 Nom anglais : Western Corella
 Nom allemand : Wühlerkakadu
 Nom espagnol : Cacatua Cavadora
 Nom italien : Corella beccolungo orientale




Nombre de Sous-espèce / Number subspecies : 2.
 Bague / Ring ø : 12 mm.

Origine : Australie

STANDARD	ANNOTATIONS
<p>STANDARD DE LA FORME ET DE LA POSTURE</p> <p>Taille : 45 cm.</p> <p>Type</p> <p><i>Tête</i> : Tête petite et ronde</p> <p><i>Huppe</i> : Petite et droite (3 - 4 cm)</p> <p><i>Corps</i> : Oiseau allongé haut sur pattes.</p> <p><i>Ailes</i> : Serrées le long du corps. Le bout des rémiges se rejoignent sur la queue sans se croiser.</p> <p><i>Dos</i> : Bien rectiligne, sans creux ni bosse.</p> <p>Maintien : 80°.</p> <p>Pattes : Les doigts ensèrent bien le perchoir. Ongles intacts.</p> <p>Bec : Fin et allongé (3- 5 cm)</p> <p>Condition : Plumage lisse et bien net.</p> <p>STANDARD DE COULEUR ET DESSIN</p> <p>Huppe : Blanche.</p> <p>Joues : Blanches.</p> <p>Lores : Rosés et sous plumes du masque rosés.</p> <p>Corps : Blanc avec suffision rosée.</p> <p>Ailes : Blanches sur les parties supérieures ; jaune & blanc sur l'intérieur.</p> <p>Queue : Blanches sur les parties supérieures ; jaune & blanc sur le dessous.</p> <p>Bec : Gris corne.</p> <p>Œil : Iris brun foncé - Cercle oculaire bleuté et très étendu sous l'oeil.</p> <p>Pattes : Gris.</p> <p>Ongles : Noir.</p> <p>REMARQUES</p> <p>Néant.</p> <p><i>C. p. pastinator.</i> Taille 45 cm.</p> <p><i>C. p. derbyi.</i> Plus petit que <i>pastinator</i>.</p>	

In situ selon



Internationale (1) (2) (3)



Européenne (A) (B) (C) (D)

Cacatua sulphurea

Nom français : Petit Cacatoès à Huppe jaune, Cacatoès soufré
 Nom anglais : Yellow-crested Cockatoo
 Nom allemand : Gelbwangenkakadu
 Nom espagnol : Cacatua Sulfurea
 Nom italien : Cacatua ciuffogiallo




Nombre de Sous-espèce / Number subspecies : 4
 1 Sous-espèce distincte : *C. s. citrinocristata*. Voir page suivante.

Origine : Iles de la mer de Flores et de Java

Bague / Ring ø : 10 mm.

STANDARD	ANNOTATIONS								
<p>STANDARD DE LA FORME ET DE LA POSTURE</p> <p>Taille : 31 - 33 cm.</p> <p>Type</p> <p><i>Tête</i> : Tête bien ronde <i>Huppe</i> : Fine et incurvée vers l'avant (7 - 8 cm) <i>Corps</i> : Oiseau fin et harmonieux. <i>Ailes</i> : Serrées le long du corps. Le bout des rémiges se rejoignent sur la queue sans se croiser. <i>Dos</i> : Bien rectiligne, sans creux ni bosse. <i>Maintien</i> : 80°. <i>Pattes</i> : Les doigts enserrant bien le perchoir. Ongles intacts. <i>Bec</i> : Rond et assez fort <i>Couleur</i> : Toutes les couleurs sont bien marquées et délimitées. <i>Condition</i> : Plumage lisse et bien net.</p> <p>STANDARD DE COULEUR ET DESSIN</p> <p><i>Huppe</i> : Jaune. <i>Oreillons</i> : Jaune bien délimitées. <i>Corps</i> : Blanc avec suffusions jaunes. <i>Ailes</i> : Blanches sur les parties supérieures ; jaune & blanc sur l'intérieur. <i>Queue</i> : Blanches sur les parties supérieures ; jaune & blanc sur le dessous. <i>Bec</i> : Gris noir. <i>Œil</i> : Iris brun foncé (Mâle) – Iris brun clair (Femelle) - Cercle oculaire blanc. <i>Pattes</i> : Gris. <i>Ongles</i> : Noir.</p> <p>REMARQUES</p> <p>On pourra noter des différences de couleur et de taille du bec, dû au mélange des sous-espèces.</p> <table border="1" data-bbox="108 1608 1203 1749"> <tr> <td><i>C. s. sulphurea</i></td> <td>Taille : 33 cm.</td> </tr> <tr> <td><i>C. s. parvula</i></td> <td>Présence de la couleur jaune réduite sur les oreillons, la tête et les parties inférieures.</td> </tr> <tr> <td><i>C. s. abotti</i></td> <td>Comme <i>parvula</i> mais de plus grande taille.</td> </tr> <tr> <td><i>C. s. citrinocristata</i></td> <td>Voir page suivante</td> </tr> </table>	<i>C. s. sulphurea</i>	Taille : 33 cm.	<i>C. s. parvula</i>	Présence de la couleur jaune réduite sur les oreillons, la tête et les parties inférieures.	<i>C. s. abotti</i>	Comme <i>parvula</i> mais de plus grande taille.	<i>C. s. citrinocristata</i>	Voir page suivante	
<i>C. s. sulphurea</i>	Taille : 33 cm.								
<i>C. s. parvula</i>	Présence de la couleur jaune réduite sur les oreillons, la tête et les parties inférieures.								
<i>C. s. abotti</i>	Comme <i>parvula</i> mais de plus grande taille.								
<i>C. s. citrinocristata</i>	Voir page suivante								

In situ selon



Critical



Internationale
2005



Européenne



Cacatua sulphurea citrinocristata

Nom français : Cacatoès à huppe orange
 Nom anglais : Orange-crested Cockatoo
 Nom allemand : Orangerhaubenkakadu
 Nom espagnol : Cacatua de cresto naranja
 Nom italien : Cacatua dal ciuffo arancio



Sous espèce de / Subspecies of : *Cacatua sulphurea*
 Bague / Ring ø : 11 mm.

Origine : Iles Sumba – Petites îles Sunda

STANDARD	ANNOTATIONS
<p>STANDARD DE LA FORME ET DE LA POSTURE</p> <p>Taille : 36 - 38 cm. Type <i>Tête</i> : Tête bien ronde <i>Huppe</i> : Fine et incurvée vers l'avant (7 - 8 cm) <i>Corps</i> : Oiseau fin et harmonieux. <i>Ailes</i> : Serrées le long du corps. Le bout des rémiges se rejoignent sur la queue sans se croiser. <i>Dos</i> : Bien rectiligne, sans creux ni bosse. Maintien : 80°. Pattes : Les doigts ensèrent bien le perchoir. Ongles intacts. Bec : Rond et assez fort Couleur : Toutes les couleurs sont bien marquées et délimitées. Condition : Plumage lisse et bien net.</p> <p>STANDARD DE COULEUR ET DESSIN</p> <p>Huppe : Orange. Oreillons : Orange bien délimitées. Corps : Blanc. Ailes : Blanches sur les parties supérieures ; jaune & blanc sur l'intérieur. Queue : Blanches sur les parties supérieures ; jaune & blanc sur le dessous. Bec : Gris noir. Œil : Iris brun foncé (Mâle) – Iris brun clair (Femelle) - Cercle oculaire blanc. Pattes : Gris. Ongles : Noir.</p> <p>REMARQUES On pourra noter une variation de taille et de couleur (<i>suffusions orangées sur la poitrine et le ventre</i>).</p>	

In situ selon



Internationale 1 2 3
 2005



Européenne A B C D

Cacatua galerita

Nom français : Grand Cacatoès à huppe jaune
 Nom anglais : Sulphur-crested Cockatoo
 Nom allemand : Großer Gelbhaubenkakadu
 Nom espagnol : Cacatua Galerita
 Nom italien : Grande cacatua ciuffo gallio



Nombre de Sous-espèce / Number subspecies : 5
 2 Sous-espèces distinctes : *C. g. triton* & *eleonara*. Voir pages suivantes.

Origine : Nord et Est de l'Australie, Nlle Guinée et îles avoisinantes

Bague / Ring ø : 14mm.

STANDARD	ANNOTATIONS										
<p>STANDARD DE LA FORME ET DE LA POSTURE</p> <p>Taille : 50 cm.</p> <p>Type</p> <p><i>Tête</i> : Tête fine</p> <p><i>Huppe</i> : Fine et très incurvée vers l'avant (15 - 18 cm)</p> <p><i>Corps</i> : Oiseau allongé et puissant.</p> <p><i>Ailes</i> : Serrées le long du corps. Le bout des rémiges se rejoignent sur la queue sans se croiser.</p> <p><i>Dos</i> : Bien rectiligne, sans creux ni bosse.</p> <p>Maintien : 80°.</p> <p>Pattes : Les doigts enserrant bien le perchoir. Ongles intacts.</p> <p>Bec : Rond et fort, assez fin.</p> <p>Condition : Plumage lisse et bien net.</p> <p>STANDARD DE COULEUR ET DESSIN</p> <p>Huppe : Jaune.</p> <p>Oreillons : Suffusions jaunes</p> <p>Corps : Blanc.</p> <p>Ailes : Blanches sur les parties supérieures ; jaune & blanc sur l'intérieur.</p> <p>Queue : Blanches sur les parties supérieures ; jaune & blanc sur le dessous.</p> <p>Bec : Gris noir.</p> <p>Œil : Iris brun foncé (Mâle) – Iris brun clair (Femelle) - Cercle oculaire blanc.</p> <p>Pattes : Gris.</p> <p>Ongles : Noir.</p> <p>REMARQUES</p> <p>Néant</p> <table border="1" data-bbox="106 1585 1203 1727"> <tr> <td><i>C. g. galerita</i></td> <td>Taille : 50 cm.</td> </tr> <tr> <td><i>C. g. queenslandica</i></td> <td>Taille plus petite. Type plus large et allongé.</td> </tr> <tr> <td><i>C. g. fitzroyi</i></td> <td>Plus grand que <i>queenslandica</i> et cercle oculaire bleu.</td> </tr> <tr> <td><i>C. g. eleonara</i></td> <td>Voir page Suivante</td> </tr> <tr> <td><i>C. g. triton</i></td> <td>Voir page suivante</td> </tr> </table>	<i>C. g. galerita</i>	Taille : 50 cm.	<i>C. g. queenslandica</i>	Taille plus petite. Type plus large et allongé.	<i>C. g. fitzroyi</i>	Plus grand que <i>queenslandica</i> et cercle oculaire bleu.	<i>C. g. eleonara</i>	Voir page Suivante	<i>C. g. triton</i>	Voir page suivante	
<i>C. g. galerita</i>	Taille : 50 cm.										
<i>C. g. queenslandica</i>	Taille plus petite. Type plus large et allongé.										
<i>C. g. fitzroyi</i>	Plus grand que <i>queenslandica</i> et cercle oculaire bleu.										
<i>C. g. eleonara</i>	Voir page Suivante										
<i>C. g. triton</i>	Voir page suivante										

In situ selon



Least concern



Internationale

1

2

3



Européenne

A

B

C

D

Cacatua galerita eleonara

Nom français : Cacatoès Moyen à huppe jaune
 Nom anglais : Middle Sulphur-crested Cockatoo
 Nom allemand : Finschs Gelbhaubenkakadu
 Nom espagnol : Cacatua Eleonara
 Nom italien : Cacatua cuiffo giallo minore



Sous-espèce de / Subspecies of : *Cacatua galerita*
 Bague / Ring ø : 12 mm.

Origine : Iles Aru

STANDARD	ANNOTATIONS
<p>STANDARD DE LA FORME ET DE LA POSTURE</p> <p>Taille : 38 – 42 cm..</p> <p>Type</p> <p><i>Tête</i> : Tête assez fine</p> <p><i>Huppe</i> : Fine et incurvée vers l'avant. (10-12 cm).</p> <p><i>Corps</i> : Oiseau fin et harmonieux.</p> <p><i>Ailes</i> : Serrées le long du corps. Le bout des rémiges se rejoignent sur la queue sans se croiser.</p> <p><i>Dos</i> : Bien rectiligne, sans creux ni bosse.</p> <p>Maintien : 80°.</p> <p>Pattes : Les doigts ensèrent bien le perchoir. Ongles intacts.</p> <p>Bec : Rond et fort.</p> <p>Condition : Plumage lisse et bien net.</p> <p>STANDARD DE COULEUR ET DESSIN</p> <p>Huppe : Jaune.</p> <p>Oreillons : Jaunes pâles.</p> <p>Corps : Blanc.</p> <p>Ailes : Blanches sur les parties supérieures ; jaune & blanc sur l'intérieur.</p> <p>Queue : Blanches sur les parties supérieures ; jaune & blanc sur le dessous.</p> <p>Bec : Gris noir.</p> <p>Œil : Iris brun foncé (Mâle) – Iris brun clair (Femelle) - Cercle oculaire blanc.</p> <p>Pattes : Gris.</p> <p>Ongles : Noir.</p> <p>REMARQUES</p> <p>On remarque des différences de taille assez importantes d'un sujet à l'autre.</p>	

In situ selon



Least concern



Internationale

1

2

3



Européenne

A

B

C

D

Cacatua galerita triton

Nom français : Cacatoès Triton
 Nom anglais : Triton Cockatoo
 Nom allemand : Triton Gelbhaubenkakadu
 Nom espagnol : Cacatua triton
 Nom italien : Cacatua triton

Sous-espèce de / Subspecies of *Cacatua galerita*
 Bague / Ring ø : 12 mm.

Origine : Papouasie & Nouvelle Guinée

STANDARD	ANNOTATIONS
<p>STANDARD DE LA FORME ET DE LA POSTURE</p> <p>Taille : 44 46 cm.</p> <p>Type</p> <p><i>Tête</i> : Tête assez large</p> <p><i>Huppe</i> : Fine et très incurvée vers l'avant (12 - 14 cm)</p> <p><i>Corps</i> : Oiseau trapu et puissant.</p> <p><i>Ailes</i> : Serrées le long du corps. Le bout des rémiges se rejoignent sur la queue sans se croiser.</p> <p><i>Dos</i> : Bien rectiligne, sans creux ni bosse.</p> <p>Maintien : 80°.</p> <p>Pattes : Les doigts enserrant bien le perchoir. Ongles intacts.</p> <p>Bec : Rond et fort.</p> <p>Condition : Plumage lisse et bien net.</p> <p>STANDARD DE COULEUR ET DESSIN</p> <p>Huppe : Jaune.</p> <p>Oreillons : Blancs</p> <p>Corps : Blanc.</p> <p>Ailes : Blanches sur les parties supérieures ; jaune & blanc sur l'intérieur.</p> <p>Queue : Blanches sur les parties supérieures ; jaune & blanc sur le dessous.</p> <p>Bec : Gris noir.</p> <p>Œil : Iris brun foncé (Mâle) – Iris brun clair (Femelle) - Cercle oculaire bleu.</p> <p>Pattes : Gris.</p> <p>Ongles : Noir.</p> <p>REMARQUES</p> <p>On remarque des différences de taille assez importantes d'un sujet à l'autre.</p>	

In situ selon



Internationale ① ② ③



Européenne ① ② ③ ④

Cacatua alba



Nom français : Cacatoès alba, Cacatoès blanc
 Nom anglais : Umbrella Cockatoo, White-crested Cockatoo
 Nom allemand : Weißhaubenkakadu
 Nom espagnol : Cacatua blanca
 Nom italien : Cacatua bianco

Pas de Sous-espèce / No subspecies.
 Bague / Ring ø : 12 mm.

Origine : Papouasie & Nouvelle Guinée

STANDARD	ANNOTATIONS
<p>STANDARD DE LA FORME ET DE LA POSTURE</p> <p>Taille : 42 - 46 cm.</p> <p>Type</p> <p><i>Tête</i> : Large et arrondie, plus fine chez la femelle.</p> <p><i>Huppe</i> : Bien fournie, large et recourbée vers l'arrière (10 - 12 cm)</p> <p><i>Corps</i> : Oiseau volumineux – Poitrine large et bien développée.</p> <p><i>Ailes</i> : Serrées le long du corps. Le bout des rémiges se rejoignent sur la queue sans se croiser.</p> <p><i>Dos</i> : Bien rectiligne, sans creux ni bosse.</p> <p>Maintien : 80°.</p> <p>Pattes : Les doigts enserrant bien le perchoir. Ongles intacts.</p> <p>Bec : Très puissant, rond et bien proportionné.</p> <p>Condition : Plumage lisse et bien net.</p> <p>STANDARD DE COULEUR ET DESSIN</p> <p>Huppe : Blanche.</p> <p>Oreillons : Blancs</p> <p>Corps : Blanc.</p> <p>Ailes : Blanches sur les parties supérieures ; jaune & blanc sur l'intérieur.</p> <p>Queue : Blanches sur les parties supérieures ; jaune & blanc sur le dessous.</p> <p>Bec : Gris noir.</p> <p>Œil : Iris brun foncé (Mâle) – Iris brun clair (Femelle) - Cercle oculaire blanc Légèrement bleuté.</p> <p>Pattes : Gris.</p> <p>Ongles : Noir.</p> <p>REMARQUES Néant</p>	

In situ selon



Vulnerable



Internationale 1 2 3



Européenne A B C D

Cacatua moluccensis

Nom français : Cacatoès des Moluques, Cacatoès à Huppe rouge
 Nom anglais : Salmon-crested Cockatoo
 Nom allemand : Molukkenkakadu
 Nom espagnol : Cacatua Moluquena
 Nom italien : Cacatua delle Molucche



Pas de Sous-espèce / No subspecies.
 Bague / Ring ø : 14 mm.

Origine : Iles Moluques

STANDARD	ANNOTATIONS
<p>STANDARD DE LA FORME ET DE LA POSTURE</p> <p>Taille : 45 - 55 cm.</p> <p>Type</p> <p><i>Tête</i> : Tête large et arrondie.</p> <p><i>Huppe</i> : Bien fournie, large et recourbée vers l'arrière (14 - 16 cm)</p> <p><i>Corps</i> : Oiseau volumineux - Poitrine large et bien développée.</p> <p><i>Ailes</i> : Serrées le long du corps. Le bout des rémiges se rejoignent sur la queue sans se croiser.</p> <p><i>Dos</i> : Bien rectiligne, sans creux ni bosse.</p> <p>Maintien : 80°.</p> <p>Pattes : Les doigts enserrant bien le perchoir. Ongles intacts.</p> <p>Bec : Très puissant, rond et bien proportionné.</p> <p>Condition : Plumage lisse et bien net.</p> <p>STANDARD DE COULEUR ET DESSIN</p> <p>Huppe : Rouge.</p> <p>Oreillons : Saumon</p> <p>Corps : Saumon.</p> <p>Ailes : Saumon sur les parties supérieures ; saumon & jaune sur l'intérieur.</p> <p>Queue : Saumon sur les parties supérieures ; saumon & jaune sur le dessous.</p> <p>Bec : Gris noir.</p> <p>Œil : Iris brun foncé - Cercle oculaire blanc</p> <p>Pattes : Gris.</p> <p>Ongles : Noir.</p> <p>REMARQUES</p> <p>Différences importantes de taille et de couleur générale selon les sujets.</p>	

In situ selon



Vulnerable



Internationale
1990



Européenne



Cacatua ophthalmica

Nom français : Cacatoès aux Yeux bleus
 Nom anglais : Blue-eyed Cockatoo
 Nom allemand : Brillenkakadu
 Nom espagnol : Cacatua Oftalmica
 Nom italien : Cacatua occhiblu



Pas de Sous-espèce / No subspecies
 Bague / Ring ø : 12 mm.

Origine : Ile New Britain – Archipel Bismarck

STANDARD	ANNOTATIONS
<p>STANDARD DE LA FORME ET DE LA POSTURE</p> <p>Taille : 45 – 50 cm.</p> <p>Type</p> <p><i>Tête</i> : Tête large et arrondie.</p> <p><i>Huppe</i> : Bien fournie, large et recourbée vers l'arrière (14 - 16 cm)</p> <p><i>Corps</i> : Oiseau volumineux - Poitrine large et bien développée.</p> <p><i>Ailes</i> : Serrées le long du corps. Le bout des rémiges se rejoignent sur la queue sans se croiser.</p> <p><i>Dos</i> : Bien rectiligne, sans creux ni bosse.</p> <p>Maintien : 80°.</p> <p>Pattes : Les doigts ensèrent bien le perchoir. Ongles intacts.</p> <p>Bec : Très puissant, rond et bien proportionné.</p> <p>Condition : Plumage lisse et bien net.</p> <p>STANDARD DE COULEUR ET DESSIN</p> <p>Huppe : Jaune.</p> <p>Oreillons : Blanc.</p> <p>Corps : Blanc pur et très intense.</p> <p>Ailes : Blanches sur les parties supérieures ; jaune & blanc sur l'intérieur.</p> <p>Queue : Blanche sur les parties supérieures ; légères suffusions sur le dessous.</p> <p>Bec : Gris noir.</p> <p>Œil : Iris brun foncé (<i>Mâle</i>) – Iris brun clair (<i>Femelle</i>) – Cercle oculaire bleu intense.</p> <p>Pattes : Gris.</p> <p>Ongles : Noir.</p> <p>REMARQUES Néant.</p>	

In situ selon



Vulnerable



Internationale

1

2

3



Européenne

A

B

C

D

Lophocrea leadbeateri

Anciennement *Cacatua leadbeateri*

Nom français : Cacatoès de Leadbeater
 Nom anglais : Majoor Mitchell's Cockatoo
 Nom allemand : Inkakakadu
 Nom espagnol : Cacatua Abanderada
 Nom italien : Cacatua di Leadbeater



Nombre de Sous-espèce / Number subspecies : 2.
 Bague / Ring ø : 10 mm.

Origine : Australie

STANDARD	ANNOTATIONS
<p>STANDARD DE LA FORME ET DE LA POSTURE</p> <p>Taille : 34 - 37 cm.</p> <p>Type</p> <p><i>Tête</i> : Tête ronde mais assez étroite.</p> <p><i>Huppe</i> : Fine et recourbée vers l'avant (8 - 10 cm)</p> <p><i>Corps</i> : Oiseau trapu - Large au niveau des épaules.</p> <p><i>Ailes</i> : Serrées le long du corps. Le bout des rémiges se rejoignent sur la queue sans se croiser.</p> <p><i>Dos</i> : Bien rectiligne, sans creux ni bosse.</p> <p>Maintien : 80°.</p> <p>Pattes : Les doigts enserrant bien le perchoir. Ongles intacts.</p> <p>Bec : Rond et fin, assez saillant.</p> <p>Condition : Plumage lisse et bien net.</p> <p>STANDARD DE COULEUR ET DESSIN</p> <p>Huppe : Rouge, traversée par une bande médiane jaune et terminée par une bande blanche.</p> <p>Oreillons : Roses</p> <p>Corps : Nuque rose. Poitrine rose allant progressivement vers le blanc jusqu'aux sus-caudales..</p> <p>Ailes : Blanches sur les parties supérieures ; rose & blanc sur l'intérieur.</p> <p>Queue : Blanche sur les parties supérieures ; rose & blanc sur le dessous.</p> <p>Bec : Gris corne.</p> <p>Œil : Iris brun foncé (<i>Mâle</i>) – Iris brun clair (<i>Femelle</i>) - Cercle oculaire blanc</p> <p>Pattes : Gris.</p> <p>Ongles : Noir.</p> <p>REMARQUES</p> <p>Rose plus ou moins soutenu selon les oiseaux.</p> <p><i>L. l. leadbeater</i> Taille : 35 cm.</p> <p><i>L. l. mollis</i> Rouge de la huppe plus foncé et bande jaune très réduite.</p>	

In situ selon



Least concern



Internationale

1

2

3



Européenne

A

B

C

D

Eolophus roseicapilla



Nom français : Cacatoès Rosalbin
 Nom anglais : Galah Cockatoo
 Nom allemand : Rosakakadu
 Nom espagnol : Cacatua Galah
 Nom italien : Cacatua pettorosa

Nombre de Sous-espèce / Number subspecies : 2.
 Bague / Ring ø : 10 mm.

Origine : Australie

STANDARD	ANNOTATIONS						
<p>STANDARD DE LA FORME ET DE LA POSTURE</p> <p>Taille : 32 - 36 cm.</p> <p>Type</p> <p><i>Tête</i> : Tête arrondie et fine.</p> <p><i>Huppe</i> : Huppe courte, bien fournie, légèrement recourbée vers l'arrière (3 cm)</p> <p><i>Corps</i> : Oiseau trapu – Poitrine bien ronde.</p> <p><i>Ailes</i> : Serrées le long du corps. Le bout des rémiges se rejoignent sur la queue sans se croiser.</p> <p><i>Dos</i> : Bien rectiligne, sans creux ni bosse.</p> <p>Maintien : 70°.</p> <p>Pattes : Les doigts ensèrent bien le perchoir. Ongles intacts.</p> <p>Bec : Fin.</p> <p>Condition : Plumage lisse et bien net.</p> <p>STANDARD DE COULEUR ET DESSIN</p> <p>Huppe : Rose pâle</p> <p>Oreillons : Rouge rosé. Idem corps.</p> <p>Corps : Rouge rosé.</p> <p>Ailes : Grises. Rémiges grises foncées. Couvertures gris plus clair. Petite bande alaire blanche.</p> <p>Queue : Gris clair. Gris foncé sur le dessous.</p> <p>Croupion : Gris très clair.</p> <p>Sous-caudales : Gris très clair.</p> <p>Bec : Couleur corne.</p> <p>Œil : Iris brun à brun rouge - Cercle oculaire rouge rosé granuleux.</p> <p>Pattes : Gris.</p> <p>Ongles : Noir.</p> <p>REMARQUES</p> <p>Variation de taille et de couleur selon les individus.</p> <table border="1" data-bbox="108 1675 1203 1794"> <tr> <td><i>E. r. roseicapilla</i></td> <td>Taille : 35 cm.</td> </tr> <tr> <td><i>E. r. albiceps</i></td> <td>Dessus de la tête et huppe blanche. Contour de l'œil nu. Couleur générale plus pâle. Présence de gris sur la poitrine.</td> </tr> <tr> <td><i>E. r. kuhli</i></td> <td>Plus pâle que <i>albiceps</i>.</td> </tr> </table>	<i>E. r. roseicapilla</i>	Taille : 35 cm.	<i>E. r. albiceps</i>	Dessus de la tête et huppe blanche. Contour de l'œil nu. Couleur générale plus pâle. Présence de gris sur la poitrine.	<i>E. r. kuhli</i>	Plus pâle que <i>albiceps</i> .	
<i>E. r. roseicapilla</i>	Taille : 35 cm.						
<i>E. r. albiceps</i>	Dessus de la tête et huppe blanche. Contour de l'œil nu. Couleur générale plus pâle. Présence de gris sur la poitrine.						
<i>E. r. kuhli</i>	Plus pâle que <i>albiceps</i> .						

In situ selon



Least concern



Internationale

1

2

3



Européenne

A

B

C

D